

を登

つ は 13 う 何

ている時に、

② 胸

完全体

逝

てきています。

禁煙

圧迫されるような痛みが出

莅

です。 か、

例えば①

坂 痛

道 to

禁煙

0

ため

にい

ろい

うるな

間稲城市保健ヤ

現

③安静で5

~10分で改

ますのでご相談

ń 0 妚 薬

来を行っている医院もあ

は比較的

自覚するこ

症状だと思います。

ょ

る胸痛

である可能性が

厚

、ため、

自ら受診

つける

0)

は難

そ Ü

となります。

ではどのような人が狭

3

の種類

や持続時間も様

V

しょうか。

一般的

じリス

しばらく検診を受けて

心筋

康 塞₹ ます

が

心

配の的

Щ

です。

服

• 尿 な

糖尿病

受けましょ

ゔ゙

今年は

脂 症

血

症

は

内 高 圧

でコン

口

 $\overline{10}$

万回

₹

動き続

'n 毎 を

種える

の中

でも「狭心症」

喫煙

高高

血

•

病

•

高 ク

とい

う方はぜひ検

診 13

てい は心臓由

されるような痛みまで、 チクッとした痛みから圧

痛 泊

心

筋梗塞の

リスクが高

13 , O 心症・

で

検診が大切 いと思います。 て病気を見 に乏しい

な

の

です。 だから

は

問診

である程度

判断

する 塞

することで狭心症

筋 禁煙 でき 1

寒 な ま 1 • 脂 は

目を向

けて

か。

いた。 田 は は は た は た れ ま せ ん

樹₺

市医師会

重要な点

0)

リスクを下げることができ

9

狭心症

心筋

稉 痛

せん。

かし

|喫煙

は 小 。

来

0)

胸

できますが

根治

は

、る心

臓を守っ

てあ けてく

げ

ĺ

ŧ

ご自身

0)

健康

が

響

いた。

となると狭心症

治症

・糖尿病は自覚症

获

④左肩や顎にまで

痛

ばと思

います。

高

近丘 ただけ

胸

☎378 − 3421

続

た

4)胸 が

は

W

かがでしょ

いうか。

現在

£

な痛

3

③ ど 以外に

る方も禁煙

を検

討 喫

てみ

7

る

ます

から

現 在

煙

痛